

28. feladat – A CHSH egyenlőtlenséghez

Legyen $\mathcal{H}_{12} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ két feles spin összetett rendszere: $\dim \mathcal{H}_1 = \dim \mathcal{H}_2 = 2$. Feles spin esetén a három ortogonális spin-irányhoz tartozó operátorok $S_i = \frac{\hbar}{2}\sigma_i$ (gyorsírással $\mathbf{S} = \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}$), és az adott $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$, $\|\mathbf{a}\|^2 = 1$ irányú spin-mérés operátora $S_{\mathbf{a}} = \sum_i a_i S_i$ (gyorsírással $S_{\mathbf{a}} = \mathbf{a}\mathbf{S}$). Az összetett rendszer két részrendszerén a megfelelő mérhető mennyiségek operátorai $S_{\mathbf{a}} \otimes I$ és $I \otimes S_{\mathbf{b}}$, a spin-korrelációs méréshez tartozó obszervábilis $S_{\mathbf{a},\mathbf{b}} = (S_{\mathbf{a}} \otimes I)(I \otimes S_{\mathbf{b}}) = S_{\mathbf{a}} \otimes S_{\mathbf{b}}$.

a.) Számítsuk ki az

$$E(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \langle \psi | S_{\mathbf{a},\mathbf{b}} | \psi \rangle$$

várhatóértéket a $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$ szinglet-állapotban! (Órán felírtam, most számoljuk ki.)

b.) A CHSH-egyenlőtlenség (Bell-egyenlőtlenség egy változata)

$$\left(\frac{\hbar}{2}\right)^{-2} (E(\mathbf{a}, \mathbf{b}) - E(\mathbf{a}, \mathbf{b}') + E(\mathbf{a}', \mathbf{b}) + E(\mathbf{a}', \mathbf{b}')) \leq 2,$$

keressünk legalább egy olyan \mathbf{a} , \mathbf{a}' , \mathbf{b} , \mathbf{b}' mérési irány-készletet, amikre ez sérül!

Hogy ne csak az ismert dolgok legyenek, gyengítsük egy kicsit a lehetőségeinket: tudjuk sérteni az egyenlőtlenséget nem teljesen összefont állapottal is? Erről szól a következő két részfeladat:

c.) Számoljuk ki az $E(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ várhatóértéket a $|\psi'(\eta)\rangle = \sqrt{\eta}|01\rangle - \sqrt{1-\eta}|10\rangle$ állapotban! ($0 \leq \eta \leq 1$, ez lokális-unitér ekvivalens a szokásos Schmidt alakkal, de ezzel kicsit szebben lehet számolni. Az a lényeg, hogy az η paraméterrel folytonosan változtatjuk az állapot összefontságát, lásd a 30.f feladatban.)

d.) A b.) feladatban talált \mathbf{a} , \mathbf{a}' , \mathbf{b} , \mathbf{b}' mérési beállításokkal milyen intervallumba eshet η ahhoz, hogy a Bell-egyenlőtlenség sérüljön? (Vagyis milyen az a legkevésbé összefont állapot, amivel még sérteni lehet az egyenlőtlenséget?)

e.) Sok plusz pontért: Mutassuk meg, hogy bármely kis (de nem nulla) összefontság esetén lehet találni olyan mérési beállításokat, amivel a Bell-egyenlőtlenség sérthető! (Azért sok plusz pontért, mert nem néztem meg, hogy meg lehet-e így csinálni... Más megközelítésből viszonylag könnyen adódik, remélem, eljutunk odáig következő órán!)

29. feladat – A teleportáláshoz

Legyen $\mathcal{H}_{12} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ két feles spin összetett rendszerének Hilbert-tere: $\dim \mathcal{H}_1 = \dim \mathcal{H}_2 = 2$. A Bell-állapotok ezen a Hilbert-téren $|B_0\rangle, |B_1\rangle, |B_2\rangle, |B_3\rangle$, lásd a 12. feladatban (HF04.pdf).

Az órán lesz szó a teleportálási protokollról, amiben három qubit vesz részt: $\mathcal{H}_{123} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 \otimes \mathcal{H}_3$, $\dim \mathcal{H}_1 = \dim \mathcal{H}_2 = \dim \mathcal{H}_3 = 2$. A számításánál kihasználjuk az e tér megfelelő elemeire vonatkozó alábbi egyenlőséget:

$$|\chi\rangle \otimes |B_0\rangle = \frac{1}{2} \sum_{j=0}^3 |B_j\rangle \otimes (\sigma_j |\chi\rangle).$$

Számoljuk ki, hogy tényleg így van! (Itt is lehet fát vágni, de elegánsabban érhetünk célt a „Flip” operátorral, $F \in \text{Lin } \mathcal{H}_{13}$, aminek hatása $F|\psi_1\rangle \otimes |\psi_3\rangle = |\psi_3\rangle \otimes |\psi_1\rangle$, felírva ennek mártixát, és kifejtve a Pauli mártixok tenzorszorzatainak bázisán.)

30. feladat – Konkurencia

Legyen $\rho \in \mathcal{D}(\mathcal{H})$ sűrűség operátor, és $\dim \mathcal{H} = d$. A konkurencia-négyzet a $q = 2$ paraméterű Tsallis-entrópia normált változata:

$$C^2(\rho) = 2S_2^{\text{Ts}}(\rho) = 2(1 - \text{tr } \rho^2),$$

tehát ez is a sűrűség mártix kevertségét jellemzi.

- Ellenőrizzük, hogy $C^2(\rho) \leq 2 \frac{d-1}{d}$, és ezt a maximumot fel is veszi!
- Legyen $d = 2$ (qubit)! Ekkor $C^2(\rho)$ arányos lesz a sűrűség mártix egy invariánsával. Hogy fog kinézni? (Ismét lehet fát vágni, de használhatjuk a Cayley-Hamilton tételt is.)
- Szintén qubitre, használjuk a sűrűségmártix Bloch-vektoros felírását: $\rho = \frac{1}{2}(\mathbf{I} + \mathbf{x}\boldsymbol{\sigma})$, ahol $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, $\|\mathbf{x}\|^2 \leq 1$ a Bloch-vektor a spin iránya. Számítsuk ki $C^2(\rho)$ -t ekkor!

Legyen $\mathcal{H}_{12} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ két részrendszer összetett rendszerének Hilbert-tere, és $\pi = |\psi\rangle\langle\psi| \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_{12})$ tiszta állapot a $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_{12}$ vektorral megadva. ($|\psi\rangle = \sum_{i,j=0}^1 \psi^{ij} |ij\rangle$) Ennek a *tiszta* állapotnak az összefontságának mértékét jellemzi (ezt majd fogjuk látni előadáson) az összetett tiszta állapot konkurenciája (írott nagy \mathcal{C}), ami a részrendszer kevertségének mértéke annak konkurenciájával:

$$\mathcal{C}(\psi) = C(\pi_1), \quad \text{ahol } \pi_1 = \text{tr}_2 \pi, \quad \pi = |\psi\rangle\langle\psi|.$$

- Ugye igaz, hogy $C(\pi_1) = C(\pi_2)$, ha π_1 és π_2 egy tiszta állapot két redukáltja?
- Két qubit esetén, felhasználva a b.) feladatban kapott eredményt, könnyen kapunk erre egy formulát a ψ^{ij} „kifejtési-együttható mártix” egy invariánsával. Mi lesz ez a formula?
- Ismét két qubitre, legyen $|\psi(\eta)\rangle = \sqrt{\eta}|00\rangle + \sqrt{1-\eta}|11\rangle$ Schmidt-kanonikus alak. Számoljuk ki a $\mathcal{C}(\psi(\eta))$ konkurenciáját! Ugyanannyi lesz, mint az előző feladatbeli $|\psi'(\eta)\rangle$ állapotra? Milyen η paraméterek esetén lesz az állapot szeparálható ($\mathcal{C} = 0$), és mikor lesz maximálisan összefonó (\mathcal{C} maximális)?